

# PRODUKTDATABLAD

## Nicorette invisi plaster

Nicorette Plaster er et middel til hjælp ved rygeophør. Det virker på din nikotinrang og på dine abstinenser. Nicorette giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken. Rygetrangen mindskes ved brug af Nicorette Invisi depotplastre, fordi depotplastrene afgiver nikotin, når de sidder på huden



**Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.**

**10 mg / 16 timer:** nicotin 15,75 mg

**15 mg/16 timer:** nicotin 23,62 mg

**25 mg/ timer:** nicotin 39,37 mg

### Ingredienser:

**Øvrige indholdsstoffer:** bagbeklædningsfilm (polyester), ikke-vævet polyester, polybuten, polyisobutylen (lav massevægt og medium massevægt), silicone, silicieret polyester (frigivelsesbøsning).

### Indikation:

Anvendes ved rygestop

Din dosis afhænger af din nikotinafhængighed. Det er individuelt, hvor længe du skal tage Nicorette. Du skal normalt ikke bruge Nicorette i længere end 6 måneder. Du kan få behov for længere behandling for at undgå, at du begynder at ryge igen. Anvendelse af Nicorette længere end 1 år anbefales ikke. Tal med lægen.

### Dosering:

**Hvis du ryger mere end 20 cigaretter per dag anbefales det at du begynder med:**

- 1 plaster a 25 mg/16 timer daglig i 8 uger, derefter
- 1 plaster a 15 mg/16 timer daglig i 2 uger og endelig
- 1 plaster a 10 mg/16 timer daglig i 2 uger.

**Hvis du ryger mindre end 20 cigaretter per dag anbefales det at du begynder med:**

- 1 plaster a 15 mg/16 timer daglig i 8 uger, derefter
- 1 plaster a 10 mg/16 timer daglig i 4 uger.

### Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicorette Invisi, hvis:

- Du har haft et hjertetilfælde for nylig, har ustabile eller forværrede brystmerter, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, ukontrolleret forhøjet blodtryk eller for nylig har haft et slagtilfælde (hjerneblødning eller blodprop). I disse tilfælde bør du ikke anvende medicinsk behandling; men holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning. Tal med din læge, hvis det ikke lykkes.
- Du har alvorligt forhøjet blodtryk, stabil angina pectoris eller dårligt hjerte.
- Du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
- Du har tillukning af blodkar langt fra hjertet.
- Du fornylig har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af

# PRODUKTDATABLAD

## Nicorette invisi plaster

kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation.

- Du har diabetes. Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen. Husk at måle dit blodglukose, så du undgår ubehag som følge af svingninger i koncentrationen.
- Du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet.
- Du har en svulst i binyremarven (fækromocytom).
- Du har dårlig lever.
- Du har meget dårlige nyrer.
- Du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
- Du har eksem eller betændelse i huden. I tilfælde af alvorlig eller vedvarende reaktion på det sted, hvor plasteret anbringes (f.eks. kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse), eller i tilfælde af en udbredt hudreaktion (f.eks. nældefeber eller udslæt) bør behandlingen afbrydes.

**Opbevaring:** Ved temperaturer under 25 °C. og steder, der er utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:** Se holdbarhedsdato på emballagen.

**Håndtering og destruktion:** Aflever altid medicin rester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7552110	Nicorette	Håndkøbsmedicin plaster 16 timer HF	10 mg	Æske a 14 stk.	065752
7552115	Nicorette	Håndkøbsmedicin plaster 16 timer HF	15 mg	Æske a 7 stk.	065740

#### ANSVARLIGT FIRMA

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstrasse 2, D-56626 Andernach, Tyskland