

# PRODUKTDATABLAD

## Strepsils Honning & Citron

Sugetabletter med bakteriedræbende effekt og virker smertelindrende til øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.

Til anvendelse i mundhulen. Skal opløses langsomt i munden.

Strepsils med honning & Citron bør ikke gives til børn under 6 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.



### Dosering

- **Den anbefalede dosis er:**

- 0. Børn over 6 år voksne og ældre:



1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

- Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn til børn under 11 år.

### Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

- **Tag ikke dette lægemiddel**

- 0. Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).

- **Forsigtighedsregler:**

1. Tal altid med lægen inden du tager Strepsils med honning & Citron sugetabletter hvis du er diabetiker, da Strepsils med honning & Citron indeholder 1.0 g glucose og 1.5 g saccharose pr. sugetablet.
2. Bør ikke anvendes hvis du lider af arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

- **Brug af anden medicin:**

1. Ingen kendte interaktioner.

# PRODUKTDATABLAD

## Strepsils Honning & Citron

- **Graviditet og amning:**
  1. Kan anvendes til gravide og ammende men det vides ikke om 2,4- dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol eller metabolitter heraf udskilles i modermælk derfor kan det ikke udelukkes, at der kan være en risiko for nyfødte/spædbørn.
- **Trafik- og arbejdssikkerhed:**
  1. Ingen mærkning.
- **Overdosering:**
  1. Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven.

### Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

- **De mulige bivirkninger som du kan opleve er:**
- Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
  0. Overfølsomhedsreaktioner. Prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme.
    1. Ubehag/gener i munden samt halsirritation og føleforstyrrelse i munden.
    2. Udslæt.
- Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
  1. Kvalme samt sure opstød / halsbrand.
- Ikke kendt hyppighed (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data):
  1. Mavesmerter.

### Opbevaring og holdbarhed

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevares i original emballage.
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
- Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7520108	Strepsils	Sugetabletter Honning & Citron	36 stk.	541169